

Tabuľka 1 Pravidelné a nepravidelné schémy očkovania

Tabuľku je potrebné používať spoločne s textom a vysvetľvkami pod tabuľkou.

		vek dieťaťa																																
Vakcína		nar	0 mes.	1 mes	2 mes	3 mes	4 mes	5 mes	6 mes	7 mes	8 mes	9 mes	10 mes	11 mes	12 mes	13 mes	14 mes	15 mes	18 mes	2-3 r	4-5 r	6 rok	7-10 r	11 r	12 r	13 r	14.r.	15.r.	16 r.	17.r	18. r			
DTaP					1.d		2.d							3.d								1.p												
Tdap																										2.p								
VHB	pravidelné				1.d		2.d							3.d																		**		
	HBsAg + matka*	1.d		2.d		3.d		4.d ***						5.d																		**		
IPV					1.d		2.d							3.d								1.p				2.p								
Hib	pravidelné				1.d		2.d							3.d																				
	od 6 mesiacov								1.d		2.d																							
	od 1 - 5 rokov													1.d																				
PNEUMOKOK	pravidelné				1.d		2.d							3.d																				
	od 6 mesiacov								1.d		2.d			3.d																				
	od 1 roku													1.d		2.d																		
	od 2 rokov																					1.d												
MMR																						1.dávka				2. dávka								

vek pre pravidelné očkovanie

vek pre očkovanie pri premeškání

Minimálny vek očkovania

** vakcína s obsahom 20 µg HbsAg
 *** dávka VHB sa podá, iba ak nie je dostupná kombinovaná vakcína bez VHB zložky

HBsAg pozitívna matka* - súčasne s 1. dávkou sa podáva HBIG (hyperimúnny špecifický ľudský imunoglobulín)

d = dávka základného očkovania, p = dávka preočkovania

DTaP = vakcíny s vyšším obsahom diftérieového a pertusového toxoidu

Tdap = vakcíny s nižším obsahom diftérieového a pertusového toxoidu

Tabuľka 2 Schéma očkovania pri začatí očkovania v neskoršom veku ako je určený vek

<i>Poradie dávky a typ vakcíny</i>		<i>Minimálny interval</i>	<i>Poznámka</i>
<i>Dieťa vo veku 1 - 2 roky</i>			
1. DTaP+IPV+VHB+Hib			
2. DTaP+IPV+VHB+/- (Hib)		4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace s/bez Hib zložky
3. DTaP+IPV+VHB		6 mesiacov	odporúčaný interval: 6 mesiacov bez Hib zložky
1. MMR			očkovanie od 15. mesiaca veku kedykoľvek
PCV	<u>A alternatíva</u> 1. PCV 13	2 dávky od 1 roka do 2 rokov v odstupe minimálne 2 mesiace	od 2 rokov veku jedna dávka
	<u>B alternatíva</u> 1. PCV10	2 dávky od 1 roka do 2 rokov v odstupe minimálne 2 mesiace	od 2 rokov veku jedna dávka
<i>Dieťa vo veku 3 - 4 roky</i>			
1. DTaP+IPV+VHB+Hib			
2. DTaP+IPV+VHB+/- (Hib)		4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace s/bez Hib zložky
3. DTaP+IPV a samostatná VHB		5 mesiacov (VHB) 6 mesiacov (DTaP)	odporúčaný interval: 6 mesiacov
PCV	1. PCV13		
	1. PCV10		možno podať do veku 5 rokov
1. MMR			kedykoľvek
2. MMR		4 týždne	odporúčaný interval: 6 mesiacov druhá dávka v 5. roku života
<i>Dieťa vo veku 5 - 6 rokov</i>			
1. DTaP+IPV a samostatná VHB			
2. DTaP+IPV a samostatná VHB		4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace

3. DTaP+IPV a samostatná VHB	5 mesiacov (VHB) 6 mesiacov (DTaP)	odporúčaný interval: 6 mesiacov
4. DTaP+IPV	6 - 12 mesiacov	preočkovanie – 4. dávka Td
1. MMR		kedykoľvek
2. MMR	4 týždne	odporúčaný interval: 6 mesiacov
<i>Dieťa od 7 rokov</i>		
1. Tdap+IPV a samostatná VHB		
2. <u>A. alternatíva:</u> Td a samostatná IPV a samostatná VHB <u>B. alternatíva:</u> Tdap+IPV a samostatná VHB	4 týždne	odporúčaný interval: 2 mesiace prvá oficiálne odporúčaná alternatíva je komplikovaná nedostupnosťou samostatnej IPV vakcíny
3. <u>A. alternatíva:</u> Td a samostatná IPV a samostatná VHB <u>B. alternatíva:</u> Tdap+IPV a samostatná VHB	5 mesiacov (VHB) 6 mesiacov (DTaP)	odporúčaný interval: 6 mesiacov prvá oficiálne odporúčaná alternatíva je komplikovaná nedostupnosťou samostatnej IPV vakcíny
4. Td a samostatná IPV	6 – 12 mesiacov	najvhodnejšie v 13. roku
1. MMR		kedykoľvek
2. MMR	4 týždne	odporúčaný interval: 6 mesiacov