

C. Posúdenie miery rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál

	Druh testu ošetrovateľského problému/rizika	Počet bodov		Detekcia najvyššieho rizika destabilizácie
ADL	Activities of daily living - Barthelov test		<input type="checkbox"/> 0 - 40 bodov (vysoko závislý)	<input type="checkbox"/> áno
			<input type="checkbox"/> 41- 60 bodov (závislosť stredného stupňa)	
Nortonovej škála	Riziko vzniku dekubitov		<input type="checkbox"/> 9 - 13 bodov (veľmi vysoké riziko)	<input type="checkbox"/> áno
			<input type="checkbox"/> 14 - 18 bodov (vysoké riziko)	
MMS	Mini Mental State Examination - test kognitívnych funkcií		<input type="checkbox"/> 0 -10 bodov (ťažká kognitívna porucha)	<input type="checkbox"/> áno
			<input type="checkbox"/> 11 - 20 bodov (stredne ťažká kognitívna porucha)	
MNA	Mini Nutritional Assessment		<input type="checkbox"/> menej ako 17 bodov (podvyživený)	<input type="checkbox"/> áno
			<input type="checkbox"/> 17 - 23,5 bodu (riziko podvýživy)	
FRAIL TEST	Test prítomnosti syndrómu krehkosti		<input type="checkbox"/> 3 a viac bodov (svedčí pre frailty)	<input type="checkbox"/> áno
			<input type="checkbox"/> 1 - 2 body (vyššie riziko)	

D. Prítomné riziko destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením

- Epileptické záchvaty
- Chronické orgánové zlyhávanie
- Pokročilé nádorové ochorenie
- Komplikácie diabetu

Dátum:

.....
Meno, priezvisko zodpovednej osoby

.....
Podpis a odtlačok pečiatky

Dátum:

.....
Meno, priezvisko lekára

.....
Podpis a odtlačok pečiatky